

UPUTE

METOJECTPEN®

Propisan vam je lijek Metojectpen®, napunjena injekcijska brizgalica s metotreksatom, koja se treba upotrebljavati jednom tjedno, po mogućnosti svaki put istog dana u tjednu.

Metojectpen® je dostupan u različitim dozama. Doza koja vam je propisana ovisi o aktivnosti vaše bolesti, o tome kako se osjećate i drugim individualnim čimbenicima koji mogu biti značajni. Vaš će liječnik u dogovoru s vama odrediti odgovarajuću dozu.

Ove upute za uporabu namijenjene su bolesnicima kojima je ovaj lijek propisan. Pažljivo pročitajte informacije i uvijek se pridržavajte onoga što vam je liječnik propisao. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se zdravstvenom djelatniku ili ljekarniku. Potpune informacije o lijeku, uključujući mjere opreza i ograničenja, možete pronaći na mrežnom mjestu www.fass.se.

- 1 Zaštitna kapica**
koja se uklanja prije uporabe
- 2 Prozor**
za provjeru je li ubrizgavanje gotovo
- 3 Automatski štitnik igle**
kako bi se spriječila slučajna ozljeda ubodom igle

7,5 mg 0,15 ml	10 mg 0,2 ml	12,5 mg 0,25 ml	15 mg 0,3 ml	17,5 mg 0,35 ml
20 mg 0,4 ml	22,5 mg 0,45 ml	25 mg 0,5 ml	27,5 mg 0,55 ml	30 mg 0,6 ml

DOZE


Svaka doza ima jedinstvenu šifru boje kako bi se olakšala identifikacija različitih doza.

VIDEOZAPIS S UPUTAMA

Skenirajte QR kod ili posjetite mrežno mjesto www.medicininstruktioner.se kako biste pogledali videozapis s uputama za Metojectpen® (švedski govor).



meto
ject pen
(metotrexat)




UPUTE – PEN

Uvijek pročitajte informacije i upute isporučene s proizvodom.



1




Očistite mjesto ubrizgavanja alkoholnom vatom ili sapunom i vodom.

2



Skinite zaštitni poklopac povlačenjem prema gore. Nemojte savijati ili uvijati!

3



Stavite brizgalicu na kožu pod kutom od 90 stupnjeva.

4



Započnite ubrizgavanje tako da čvrsto pritisnete brizgalicu na kožu. Klik ukazuje na to da je ubrizgavanje započelo.

5



Držite brizgalicu na mjestu tijekom ubrizgavanja. Drugi klik (i plavi prozor) ukazuje na to da je ubrizgavanje završeno (maks. 5 sekundi).

6



Završite ubrizgavanje uklanjanjem brizgalice s kože. Plavi štitnik igle automatski će se zaključiti.

► Metojectpen® se primjenjuje jednom tjedno!

medac

www.medac.se | info@medac.se

Metojectpen® (metotreksat) otopina za ubrizgavanje u napunjenoj injekcijskoj brizgalici

Metojectpen® se upotrebljava za: Metojectpen® se upotrebljava za liječenje aktivnog reumatoidnog artritisa kod odraslih bolesnika, poliartritičnih oblika teškog, aktivnog juvenilnog idiopatskog artritisa kad se odgovor na liječenje nesteroidnim protuupalnim lijekovima (NSAID) pokaže neadekvatnim, umjerene do teške psorijaze kod odraslih bolesnika i teškog psorijatičnog artritisa kod odraslih i blage do umjerene Crohnove bolesti kod odraslih bolesnika kad ne postoji druga odgovarajuća terapija lijekovima. Metojectpen® ublažava simptome i usporava napredovanje bolesti. Lijek metotreksat sadržan u proizvodu Metojectpen® također se može odobriti za liječenje bolesti koje nisu navedene u ovim informacijama o proizvodu. Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili nekom drugom zdravstvenom djelatniku ako imate dodatnih pitanja i uvijek slijedite njihove upute.

Nemojte upotrebljavati Metojectpen® ako ste alergični na metotreksat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka, imate bolest jetre, tešku bolest bubrega ili poremećaj krvi, redovito pijete velike količine alkohola, imate tešku infekciju kao što je tuberkuloza, HIV ili neki drugi sindrom imunodeficijencije, imate čireve u ustima, želucu ili crijevima, ako ste trudni ili dojite ili se planirate cijepiti živim cjepivom.

Doziranje: Metojectpen® smije se upotrebljavati samo jednom tjedno za liječenje reumatoidnog artritisa, juvenilnog idiopatskog artritisa, psorijaze, psorijatičnog artritisa i Crohnove bolesti. Uporaba previše proizvoda Metojectpen® (metotreksat) može biti opasna po život. U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku prije uporabe lijeka.

Posebne mjere opreza: Metotreksat privremeno utječe na proizvodnju spermija i jajnih stanica. U većini slučajeva proizvodnja će se vratiti u normalu nakon prestanka liječenja. Metotreksat može uzrokovati spontani pobačaj i teške urođene deformacije. Ako ste žena, morate izbjegavati trudnoću dok uzimate metotreksat i najmanje 6 mjeseci nakon prestanka liječenja. Ako ste muškarac, morate izbjegavati oplodnju žene dok uzimate metotreksat i najmanje 3 mjeseca nakon prestanka liječenja.

Pročitajte informacije koje dolaze s proizvodom jer sadržavaju važne podatke za vas.

medac
Hyllie Stationstorg 31
SE-215 32 Malmö
Švedska

e-adresa: info@medac.se
tel. +46 (0)44 - 785 06 66