

MODE D'EMPLOI


METOJECTPEN®

On vous a prescrit Metojectpen®, un stylo injecteur prérempli de méthotrexate, à utiliser une fois par semaine, de préférence le même jour de la semaine.

Metojectpen® est disponible en différents dosages. Le dosage qui vous est prescrit dépend de l'activité de votre maladie, de comment vous vous sentez et d'autres facteurs qui peuvent être importants. Votre médecin décidera avec vous du dosage approprié.

Ce mode d'emploi s'adresse aux patients à qui ce médicament a été prescrit. Lisez attentivement la notice et respectez toujours les prescriptions de votre médecin. Si vous avez des questions, veuillez contacter un professionnel de santé ou un pharmacien. Vous trouverez des informations complètes sur le médicament, y compris les précautions et les restrictions, sur le site suivant : www.fass.se.

- 1 Capuchon de protection**
à retirer avant utilisation
- 2 Fenêtre d'inspection**
pour vérifier que l'injection est terminée
- 3 Protection automatique de l'aiguille**
pour éviter toute blessure accidentelle par piqûre d'aiguille



7,5 mg 0,15 ml	10 mg 0,2 ml	12,5 mg 0,25 ml	15 mg 0,3 ml	17,5 mg 0,35 ml
20 mg 0,4 ml	22,5 mg 0,45 ml	25 mg 0,5 ml	27,5 mg 0,55 ml	30 mg 0,6 ml

DOSES

Chaque dose a un code couleur unique, pour faciliter l'identification des différentes doses.

VIDÉO DIDACTIQUE

Scanner le code QR ou rendez-vous sur www.medicininstruktioner.se pour visionner une vidéo didactique sur Metojectpen® (discours suédois).



meto
ject pen
(metotrexat)

MODE D'EMPLOI – STYLO

Toujours lire la notice et le mode d'emploi fournis avec le produit.



- 1** Nettoyer le site d'injection avec un tampon imbibé d'alcool ou avec de l'eau savonneuse.
- 2** Retirer le capuchon de protection en le tirant vers le haut. Ne pas plier ni tordre !
- 3** Plaquer le stylo contre la peau à un angle de 90 degrés.
- 4** 1er clic
Commencer l'injection en appuyant fermement le stylo contre la peau. Un clic indique que l'injection a commencé.
- 5** 2e clic
5 sek.
Maintenir le stylo en place tout au long de l'injection. Un deuxième clic (et une fenêtre bleue) indique que l'injection est terminée (le processus peut prendre jusqu'à 5 secondes).
- 6** Terminer l'injection en retirant le stylo de la peau. Le protégé-aiguille bleu se verrouille automatiquement.

► Metojectpen® est administré **une fois par semaine!**

medac

www.medac.se | info@medac.se

Metojectpen® Solution injectable (méthotrexate) en stylo prérempli

Indications de **Metojectpen®** : Metojectpen® est utilisé pour traiter : l'arthrite rhumatoïde active chez les patients adultes ; les formes polyarticulaires de l'arthrite juvénile idiopathique active sévère lorsque la réaction au traitement par anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) s'est révélée insuffisante ; psoriasis modéré à sévère chez les patients adultes et rhumatisme psoriasique sévère chez les adultes ; maladie de Crohn légère à modérée chez les patients adultes lorsqu'il n'existe pas d'autre traitement médicamenteux approprié. Metojectpen® soulage les symptômes et ralentit la progression de la maladie. Le méthotrexate contenu dans Metojectpen® peut également être autorisé pour le traitement de maladies autres que celles énumérées dans cette notice. Veuillez vous adresser à votre médecin, pharmacien ou autre professionnel de santé si vous avez d'autres questions, et suivez toujours leurs instructions.

N'utilisez pas Metojectpen® si vous êtes allergique au méthotrexate ou à toute autre composant de ce médicament, si vous souffrez d'une maladie hépatique, d'une maladie rénale grave ou d'une maladie du sang, si vous buvez régulièrement de grandes quantités d'alcool, si vous souffrez d'une infection grave telle que la tuberculose, le VIH ou d'un autre syndrome d'immunodéficience, si vous avez des ulcères dans la bouche, l'estomac ou les intestins, si vous êtes enceinte ou allaitez ou si vous prévoyez de recevoir un vaccin vivant.

Posologie : Metojectpen® ne peut être utilisé qu'une fois par semaine pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde, de l'arthrite juvénile idiopathique, du psoriasis, de l'arthrite psoriasique et de la maladie de Crohn. L'utilisation excessive de Metojectpen® (méthotrexate) peut mettre en danger la vie du patient. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à un médecin ou à un pharmacien avant d'utiliser le médicament.

Précautions particulières : le méthotrexate affecte temporairement la production de spermatozoïdes et d'ovules. Dans la majorité des cas, la production reviendra à la normale une fois le traitement terminé. Le méthotrexate peut provoquer une fausse couche et des malformations congénitales graves. Si vous êtes une femme, vous devez éviter de débiter une grossesse pendant la prise de méthotrexate et pendant au moins 6 mois après la fin du traitement. Si vous êtes un homme, vous devez éviter de féconder une femme pendant la prise de méthotrexate et pendant au moins 3 mois après la fin du traitement.

Veuillez lire la notice fournie avec le produit, car elle contient des informations importantes pour vous.

medac
Hyllie Stationstorg 31
SE-215 32 Malmö
Suède

e-mail : info@medac.se
tél. +46 (0)44 - 785 06 66